

Из-за этого ухудшается тонус уретры, что приводит к непроизвольному подтеканию мочи при малейших нагрузках, например, при чихании или при кашле, не говоря уже о поднятии тяжестей. Во время климакса сокращается производство женских гормонов эстрогенов, которые ответственны за эластичность тканей в организме женщины, а также за связочный и мышечный аппарат тазового дна. Но чаще всего недержание — это проблема пожилых женщин. Недержание мочи у женщин в молодом возрасте обычно возникает после осложненных родов.

Чем раньше начать лечение, тем лучших результатов можно добиться. Недержание мочи у пожилых также не должно рассматриваться как естественное проявление старения организма. Таким образом, женщина меняет старый стереотип поведения и вырабатывает новый. Недержание мочи может быть краткосрочной проблемой, вызванной инфекцией мочевыводящих путей, запорами или какими-то медицинскими манипуляциями. Инконтиненция (другое название недержания) встречается и у молодых женщин, например, после родов, и у пациенток пожилого возраста, а у некоторых женщин эта деликатная проблема проявляется еще в юности и не проходит на протяжении долгого времени. При стрессовой форме недержания предпочтительным является именно оперативное лечение. С проблемой недержания мочи сталкивается больше половины женщин во всем мире. Стрессовое недержание мочи может происходить после родов, из-за увеличения веса или других факторов, из-за которых растягиваются мышцы тазового дна. Недержание мочи (инконтиненция) — это выделение мочи, которое происходит непроизвольным и неконтролируемым образом. В норме позыв к мочеиспусканию появляется, когда в пузыре накапливается определенное количество мочи. Лечение недержания подбирается индивидуально для каждого человека.

В полной мере эффект приема дриптана ощущается через месяц после начала лечения. Однако, в каждом конкретном случае дозу дриптана должен подобрать врач, не пытайтесь принимать дриптан самостоятельно. Таким образом, под действием дриптана мочевой пузырь расслабляется и увеличивается в объеме, исчезают императивные позывы, с которыми женщина не могла справиться, соответственно, она начинает реже ходить в туалет.

Во время осмотра также применяется кашлевая проба, когда врач проверяет, выделяется ли моча из уретры при покашливании. Стандартный осмотр внешних половых органов и влагалища с помощью гинекологического зеркала позволяет исключить наличие других заболеваний.

<http://www.xn--8sbfczndlnbeqvs0q.xn--p1ai/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d0%ba%d0%b1-17/>

Для устранения частых императивных позывов к мочеиспусканию предпочтительными являются немедикаментозные, общие методы лечения, в частности лечебная

гимнастика. Хирургическое вмешательство в данном случае является неэффективным, а медикаментозное лечение применяется только в случае, если общие методы не дали желаемого результата.